

# ジフテリア・破傷風混合第2期予防接種のご案内

岩内町では、下記の要領で標記予防接種を実施します。  
内容をお確かめの上、接種期間内に受けていただきますよう、お願いします。

1. 対象者  
11歳以上13歳未満のお子さん
2. 接種期間 : 11歳から13歳のお誕生日の前日までの間に、1回皮下接種します。

11歳前または13歳以上で接種した場合は、接種費用が全額自己負担になります。  
接種期間内での接種をお願いします。

3. 予防接種の受け方
    - ① 指定医療機関は下記のとおりです。「1期」とは異なるワクチンのため、必ず「2種混合2期」であることを伝えて、予約してください。
    - ② 予防接種の予診票の太枠欄に必要事項を記入します。予防接種依頼券、母子手帳とともに医療機関に提出してください。なお、予約日に体調不良等により接種できない場合は、必ず医療機関に連絡してください。
- ※ 町が発行した予診票・依頼券を使い、接種期間内に指定医療機関で接種した場合のみ無料です。

## <指定医療機関一覧>

R7. 4. 1現在

医療機関(電話番号)	予防接種実施日	予防接種受付時間	予約について
岩内協会病院 (電話:62-1021)	毎週木曜日	13:00~14:00	予約受付:月・水・金: 13時~16時
大井医院 (電話:62-0986)	月~金曜日	10:30~11:30 14:00~16:00	3日前までに 電話予約
北内科クリニック (電話:62-1457)	月~土曜日	9:00~11:00 * 午後は要相談(水・土以外)	3日前までに 電話予約
岩内大浜医院 (電話:61-2081)	月~金曜日	9:00~11:30 16:00~16:30	事前電話予約
前田医院 (電話:62-1293)	月・火・木・金曜日	14:30 * 前後する場合があります。	4日前までに 電話予約
前田診療所 (電話:73-2211)	月~金曜日	9:00~11:00 ※午後は要相談	2日前までに 電話予約
茅沼診療所 (電話:75-3651)	月~金曜日	予約時に相談	10日前までに 電話予約

## 3. 予防接種間隔の変更について

令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔の制限が一部変更となり、注射生ワクチン同士の接種以外は接種間隔の制限がなくなりました。

- 注射生ワクチンは、麻しん風しん、水痘、BCG、おたふくかぜが該当します。
- 同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔は、従来どおりとなります。

## 4. その他注意事項

- ・予診票は、医師への大切な情報です。責任を持って記入しましょう。
- ・岩内町から転出された方は対象外となります。

## ジフテリア・破傷風の予防接種を受けるにあたっての説明

### 1

#### 病気の説明

##### (ア) ジフテリア

ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。

1981年(昭和56年)に現在使われているジフテリア・百日せき・破傷風混合ワクチン(DPT)が導入され、現在では患者発生数は年間0~1人程度です。しかし、ジフテリアは感染しても10%程度の人に症状が出るだけで、残りの人は症状が出ない保菌者となり、その人を通じて感染することもあります。

感染は主にのどですが、鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などで、偽膜と呼ばれる膜が出来て窒息死することもあります。発病2~3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こすことがあるため注意が必要です。

\* 飛沫感染：ウイルスや細菌がせきやくしゃみなどにより、細かい唾液や気道分泌物につつまれて空気中へ飛びだし、約1mの範囲で人に感染させることです。

##### (イ) 破傷風

破傷風菌とはヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、筋肉の強直性けいれんを起こします。最初は口が開かなくなるなどの症状が気づかれ、やがて全身の強直性けいれんを起こすようになり、治療が遅れると死に至ることもある病気です。患者の半数は本人や周りの人では気がつかない程度の軽い刺し傷が原因です。土中に菌がいるため、感染する機会は常にあります。また、お母さんが抵抗力(免疫)をもっていれば出産時に新生児が破傷風にかかるのを防ぐことができます。

### 2 予防接種に使用するワクチンとその副反応について

1期としては、DPT-IPT(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)四種混合ワクチンを初回接種3回、追加接種1回を90か月未満で接種します。

\* 令和6年度からは、DPT-IPT-Hib(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)五種混合ワクチンが使用されています。

2期では、その免疫をより強固なものにするためにDT(ジフテリア・破傷風)二種混合ワクチンを1回接種します。

#### ▷ DTワクチンの副反応

注射部位の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)などの局所反応が主で、7日目までに約31.1%認められます。

なお、硬結(しこり)は少しずつ小さくなりますが、数か月残ることがあります。特に過敏なお子さんで肘をこえて上腕全体がはれることがまれにあります。

通常高熱は出ませんが、接種後24時間以内に37.5℃以上になった子が約0.1%あります。重い副反応はなくても、機嫌が悪くなったり、はれが目立つときなどは医師に相談して下さい。

#### <お問合せ>

岩内町役場 健康づくり課 健康推進係 TEL (直通)0135-67-7086